

LATTANTE - da 0 a 1 anno

BAMBINO - da 1 anno alla pubertà



Controllare la **COSCIENZA**

Chiedere **AIUTO**:

- **Immediatamente** se i soccorritori sono almeno 2
- **Immediatamente** in caso di collasso improvviso e/o anamnesi di cardiopatia congenita o acquisita
- **Dopo 2 minuti** di RCP (5 cicli)



Valutare la **PERVIETA' VIE AEREE**
SOLLEVARE il mento effettuando una leggera estensione della testa. **ATTENZIONE: nel lattante NON IPERESTENDERE** perchè può causare la chiusura della trachea. **POSIZIONARE uno SPESSORE** sotto le spalle fino al bacino per mantenere l'apertura delle vie aeree.

NON si effettua l'esplorazione visiva o manuale della bocca se non in caso di presenza certa di un corpo estraneo



Valutare la **RESPIRAZIONE**

- **Manovra G.A.S.** (Guardo - Ascolto - Sento) per 10 secondi

Se la respirazione è **NORMALE**:

- Posizione Laterale di Sicurezza
- Chiedere aiuto
- Controllare la respirazione



Bocca - Bocca/naso

Se la respirazione **NON è NORMALE** o **NON SI E' CERTI CHE LO SIA** **COMPORTARSI COME SE NON RESPIRASSE** e procedere con

5 VENTILAZIONI di emergenza della durata di 1 secondo ciascuna (mantenere almeno un frequenza di 12 - 20 atti/min. 1 ventilazione ogni 4 - 5 secondi)



Bocca - bocca



Comprimere con 2 dita il **3° inferiore dello sterno** (1 cm. circa sotto una linea immaginaria tra i capezzoli)
 Ritmo: **100 atti/minuto**

Effettuare **30 COMPRESSI TORACICHE** (15 compressioni se 2 soccorritori)

2 VENTILAZIONI : 30 COMPRESSI (2:15 se ci sono 2 soccorritori)

NON interrompere mai RCP finchè:
 - Arrivano soccorsi qualificati
 - Avviene una ripresa delle funzioni
 - Esaurimento delle energie



Comprimere con 1 o 2 mani **al centro del torace** (parte prossimale della mano sulla linea immaginaria tra i capezzoli)
 Ritmo: **100 atti/minuto**